

COMMUNICATIONS

DE LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ D'ANKARA

Série C: Sciences naturelles

TOME 11 C

ANNEE 1966

Sur une nouvelle espèce du genre *Xysticus*
(Araneae, Thomisidae) en Turquie

SEVINÇ KAROL

2

Faculté des Sciences de l'Université d'Ankara
Ankara, Turquie

Communication de la Faculté des Sciences de l'Université d'Ankara

Comité Rédation de la Série C

S. Okay N. İlyüz H. Bağda

Secrétaire de Publication

B. C. Ünal

La Revue "Communications de la Faculté des Sciences de l'Université d'Ankara" est un organe de publication englobant toutes les disciplines scientifiques représentées à la Faculté: Mathématiques pures et appliquées, Astronomie, Physique et Chimie théoriques, expérimentales et techniques, Géologie, Botanique et Zoologie.

La Revue, à l'exception des tomes I, II, III, comprend trois séries

Série A: Mathématiques, Physique et Astronomie.

Série B: Chimie.

Série C: Sciences naturelles.

En principe, la Revue est réservée aux mémoires originaux des membres de la Faculté. Elle accepte cependant, dans la mesure de la place disponible, les communications des savants étrangers. Les langues allemande, anglaise et française sont admises indifféremment. Les articles devront être accompagnés d'un bref sommaire en langue turque.

**Sur une nouvelle espèce du genre *Xysticus*
(Araneae, Thomisidae) en Turquie**

SEVİNÇ KAROL

Département de Zoologie, Faculté des Sciences, Université d'Ankara. Ankara

(Reçu le 5 Mars 1966)

Description d'une nouvelle espèce d'araignée et son organe génital.

Le specimen a été collecté par un collègue pendant une excursion zoologique fait, à Beşgöz, aux environs de la Ferme Konuklar (Konuklar Çiftliği), près de Konya et la détermination a été faite par moi au Muséum Nationale d'Histoire Naturelle de Paris. Je dois remercier ici, Monsieur le Professeur *Max Vachon*, Directeur du Muséum, qui a eu l'obligeance de me permettre d'utiliser la collection d'Eugène Simon. Je dois remercier Monsieur *J.F. Jézéquel*, un collègue au Muséum, qui m'a encouragé continuellement.

Diagnose de *Xysticus şişlii*, n.sp.

Materiel : I ♀ ; 26.5.1963, Beşgöz, Konuklar, Konya.

Dimensions : Longueur totale: 7.4 mm

Céphalothorax : Longueur : 3.0 mm, largeur: 2.7 mm.

Abdomen : Longueur : 4.4 mm, largeur: 3.8 mm.

Bandeau pourvu d'une série de sept crins dressés, longs, robustes.

Yeux : Les yeux antérieurs un peu plus récurvés que ceux de postérieurs; la distance entre les deux médians antérieurs et celle entre les deux médians postérieurs est la même. Les yeux médians postérieurs sont les plus petits et les latéraux antérieurs sont les plus gros. La partie postérieurs des yeux latéraux est blanchâtre.

Couleur : Céphalothorax a une bande céphalique triangulaire à sommet aigu postérieurs, à côtés rectilignes. La partie qui se trouve à l'intérieure de cette bande est brunâtre et la partie arrière de la bande est jaunâtre.


Abdomen presque arrondi vers arrière, en peu étroit et angulé en avant avec un dessin très pâle grisâtre, presque invisible, en dessus. Il

est blanchâtre en dessous, il y a de petites taches foncées, rangées en cercle qui sont alignées obliquement vers les parties latérales de l'abdomen.

Coxas, throchanters et fémurs sont blanchâtre. Tibias des paires postérieurs sont, aussi, blanchâtres. Les autres extrémités sont jaunâtres. Les fémurs de deux paires antérieurs offrent deux bandes brunâtres supérieures qui sont coupées presque dans leur moitié. Les fémurs des troisièmes paires présentent deux bandes brunâtres pâles supérieures qui ne sont pas coupées. Les fémurs des quatrièmes paires offrent deux bandes jaunâtres pâles supérieures; de ces bandes, celle qui est postérieure est coupée. Tous les patellas offrent deux bandes brunes supérieures qui sont attachées au bord distal. Tous les tibias offrent, aussi, deux bandes supérieures. Tous les fémurs offrent une autre bande large postérieure jaunâtre-brunâtre qui court obliquement vers le dessous. Les deux paires antérieurs ont ces bandes, mais plus pâle comme couleur. Les coxas offrent deux bandes larges inférieures jaunâtres et une bande postérieures jaunâtre.

Les fémurs de la première paire sont armés, sur sa face antérieure, de trois épines disposées obliquement en une seule ligne.

L'épigyne comme dans la Fig. I. Fossette génitale divisée en deux parties égales par un septum chitinisé et qui commence un peu plus haut



150 u

Fig 1: *Xycticus şişlii* n. sp. ♀ epigyne.

du milieu de la plaque génitale et qui s'avance vers le devant ou le bout est élevé et non adné.

Cette espèce est à ranger dans le 1^{er} groupe d'E. Simon (type: *Xysticus cristatus*).

ÖZET

Beşgöz, Konuklar mevkiinden toplanmış, *Xysticus* cinsine ait yeni bir tür örümceğin karakterleri verilmiştir.

BIBLIOGRAPHIE

- Bonnet, P., 1959 - *Bibliographia Araneorum*, T. II, 5^{me} partie.
- Denis, J., 1952 - *Araignées du Massif du Carlit* (Pyréné Orientales). *Bul. Mus. Hist. Nat. Toulouse*, **87**, pp 51 - 73. figs. 1 - 9.
- Karol, S., 1966 - *Description d'une araignée nouvelle en Turquie* (*Araneae, Thomisidae*). *Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara*, **11 C**, 1 (1966).
- Karol, S., 1966 - *Sur une nouvelle espèce du genre Xysticus* (*Araneae, Thomisidae*). *Sous press.*
- Kraus, O., 1955 - *Spinnen von Korsika, Sardinien und Elba* (*Arach., Araneae*). *Senckenbergiana Biol.* **36**, pp 371 - 394, pl. 35 - 37.
- Kraus, O., 1955 - *Spinnen aus El Salvador* (*Arachnoidea, Araneae*) *Ergebnisse des Forschungreise A.Zilch nach El Salvador* 22 *Abh. Senckenb. Naturf. Ges.* **493**. pp I - III, 12 pl., 6 figs.
- Roeber, C.F., 1955 - *Die Araneen der Osterreichischen-Iran Expedition 1949/1950* *S.B. öst. Akad. Wiss. Abt. I*, pp 751 - 782, figs 1 - 29.
- Silhavy, V., 1944 - *Pavouci celedi Thomisidae ze zapadniko Balkanau*. *Shor. KL.priř. Brno*, **25**, pp 60 - 95, text figs 1 - 7.
- Simon, E., 1932 - *Les Arachnides de France*, T.VI, 4^{me} partie.

AVIS IMPORTANT

La Revue "Communications de la Faculté des Sciences de l'Université d'Ankara" sera publiée dorénavant sous forme de fascicules à l'arrivée de chaque article. Le tome 15 de la série A, commençant par ce fascicule, sera complété par le dernier fascicule à paraître avant le 31 décembre 1966.

Prix de l'abonnement annuel pour 1966 :

Turquie : 15 TL ; Etranger : 30 TL.

Prix de ce numéro : 5 TL (pour la vente en Turquie).

Prière de s'adresser pour l'abonnement à : Fen Fakültesi Dekanlığı,
Ankara, Turquie.